


In einer Studie der „Centers for Disease Control and Prevention“ (CDC) aus dem Jahr 2016 wurde festgestellt, dass nur 9% der Frauen bereits von dem Cytomegalovirus (CMV) gehört hatten und nur einige wenige über Präventionsmaßnahmen gegen das Virus Bescheid wussten. Das „American College of Obstetricians and Gynecologists“ (ACOG) und die CDC haben die Empfehlung ausgesprochen, dass Geburtshelfer und Gynäkologen Frauen über elementare Präventionsmaßnahmen gegen eine CMV-Ansteckung beraten. In einer Studie aus dem Jahr 2007 gaben jedoch nur 44% der Geburtshelfer und Gynäkologen an, dass sie ihre Patienten über Präventionsmaßnahmen gegen das CMV berieten.


## KINDER AUS DEN USA, DIE MIT EINER LANGFRISTIGEN KRANKHEIT GEBOREN WERDEN ODER EINE SOLCHE ENTWICKELN

Source: <http://www.cdc.gov>



## BEWUSSTSEIN VON FRAUEN ÜBER KINDERKRANKHEITEN

Quelle: <http://www.cdc.gov>



## SCHWANGERE VOR CMV SCHÜTZEN

CMV ist bei jungen Kindern weitverbreitet: Es wird geschätzt, dass bis zu 70% aller gesunden Kinder zwischen 1 und 3 Jahren CMV haben könnten.

Einige einfache Schritte können den Kontakt mit Speichel und Urin vermeiden und das CMV eindämmen:

- Waschen Sie sich häufig die Hände mit Wasser und Seife für 15-20 Sekunden, insbesondere nach dem Windelwechseln, Füttern und Putzen von Nase und Mund eines Kleinkindes, sowie beim Umgang mit Kinderspielzeug.
- Teilen Sie keine Speisen oder Getränke sowie kein Besteck mit kleinen Kindern.
- Nehmen Sie keinen Kinderschnuller in den Mund.
- Benutzen Sie nicht dieselbe Zahnbürste wie ein kleines Kind.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Speichel, wenn Sie ein Kind küssen.
- Reinigen Sie Spielzeuge, Arbeits- und andere Oberflächen, die mit Kinderspeichel oder -urin in Berührung kommen.

National CMV unternimmt große Bemühungen, Gesetzgeber und Aufsichtsbehörden über die Bedeutung von CMV-Prävention zu unterrichten. Infolgedessen hat der United States Senate ein Gesetz erlassen, das nahelegt, „größere Anstrengungen zu unternehmen, um Frauen gebärfähigen Alters über die Auswirkungen zu beraten, die das Virus auf ihre Kinder haben könnten.“ In 2011 und in 2012 bestimmte der United States Senate Juni als „Monat der Cytomegalovirus-Aufklärung“.

