

CHINCHES EN UNIDADES DE VIVIENDAS MULTIFAMILIARES

Las unidades de viviendas multifamiliares como edificios de apartamentos, condominios, casas grupales, refugios y dormitorios, pueden llegar a ser las estructuras más difíciles para erradicar la presencia de chinches. **La eliminación de las chinches en las unidades de viviendas multifamiliares depende del conocimiento, esfuerzo y cooperación de todas las personas involucradas**, incluyendo caseros, administradores de edificios, residentes y profesionales de control de plagas.

LINEAMIENTOS

- Cuando se sospecha de la presencia de chinches, inmediatamente informar al administrador del edificio.
- Para confirmar una infestación, los especímenes deben ser identificados por un especialista en entomología o profesional de control de plagas.
- Cuando la infestación es confirmada, se deben brindar a los residentes los lineamientos sobre la política de tratamientos en el edificio, instrucciones para evitar el uso de pesticidas inefectivos y potencialmente dañinos, incluyendo el uso de aerosoles “nebulizadores” e información sobre como detectar y prevenir la expansión de las chinches a través de no traer artículos potencialmente infestados a la unidad o unidades vecinas.
- En cada unidad, el administrador debe asegurarse de que sean sellados los agujeros alrededor de los conductos de ventilación y tuberías de las paredes comunes, pisos e instalaciones de luz, así como instalaciones telefónicas, de cable y eléctricas, para prevenir que las chinches se muevan entre unidades.
- **¡No demore el tratamiento!** Emplee a un profesional de control de plagas lo antes que se pueda porque las chinches van a reproducirse y extenderse, haciendo su control mucho más difícil y oneroso.
- Los inquilinos deben ser advertidos en la preparación de sus unidades eliminando desorden, lavando y garantizando el acceso para la inspección y tratamiento. De ser posible, colchones y bases de colchones deben ser envueltas en fundas o cubiertas, y se deben aplicar trampas en las patas de las camas.
- *Como mínimo*, las unidades infestadas y todas las unidades por encima, debajo y en forma adyacente, además de las áreas comunes tales como salones de paso y lavanderías, deben ser inspeccionados y tratados de ser necesario.
- Se deben realizar inspecciones de seguimiento y tratamiento cada dos semanas después del tratamiento inicial, hasta que no se observen picaduras o presencia de chinches por al menos dos meses.



Una chinche adulta

Cortesía de Centro de Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU.



Una larva o chinche joven después de alimentarse

Cortesía de la Universidad de Florida.