

2025–2026 श्वसन वायरस सेशन के लिए टीकाकरण संबंधी सिफारिशें

आयु/स्थिति	बुखार	RSV	कोविड-19
 बच्चे	सभी 6 महीने से 17 वर्ष की आयु तक के व्यक्तियों के लिए	वे सभी शिशु जो 8 महीने से कम उम्र के हैं और जिनकी माताओं को गभविस्था के दौरान RSV वैक्सीन नहीं लगी थी, साथ ही 8 से 19 महीने की आयु के वे बच्चे जो गंभीर RSV संक्रमण के उच्च जोखिम में हैं	6 से 23 महीने की आयु के सभी बच्चे - सभी 2 से 17 वर्ष की आयु के बच्चे, जिनमें कम से कम एक गंभीर बीमारी का जोखिम कारक मौजूद है, जिसमें विशेष परिस्थितियों वाले बच्चे भी शामिल हैं* - कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले बच्चे और वे बच्चे जिनके माता-पिता या अभिभावक चाहते हैं कि उन्हें कोविड-19 वैक्सीन लगाई जाए।
 गभविस्था	सभी	गभविस्था के 32वें से 36वें सप्ताह के बीच सभी गभवती महिलाओं के लिए	प्रसव के बाद और स्तनपान के दौरान सहित सभी
 वयस्क	सभी 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के	50-74 वर्ष की आयु के वयस्कों में गंभीर RSV रोग का खतरा बढ़ जाता है 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वयस्क	सभी 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के

*अन्य विशेष परिस्थितियों में शामिल हैं: दीर्घकालिक देखभाल संस्थानों या अन्य सामूहिक आवास स्थलों के निवासी; वे व्यक्ति जिन्हें कभी कोविड-19 का टीका नहीं लगा है; तथा वे व्यक्ति जिनके परिवार के सदस्य या साथ रहने वाले लोग गंभीर कोविड-19 के उच्च जोखिम में हैं।