

Zalecenia dotyczące szczepień na sezon wirusów układu oddechowego 2025–2026

Wiek/Stan	Grypa	RSV	COVID-19
 Dzieci	Wszystkie dzieci w wieku od 6 miesięcy do 17 lat	Wszystkie niemowlęta poniżej 8. miesiąca życia, których matki nie otrzymały szczepionki przeciw RSV w czasie ciąży, oraz niektóre dzieci w wieku od 8 do 19 miesięcy, u których występuje zwiększone ryzyko ciężkiego przebiegu choroby wywołanej wirusem RSV	- Wszystkie dzieci w wieku od 6 do 23 miesięcy - Wszystkie dzieci w wieku od 2 do 17 lat, u których występuje co najmniej jeden czynnik ryzyka ciężkiego przebiegu choroby, w tym dzieci znajdujące się w szczególnych sytuacjach* Dzieci z osłabionym układem odpornościowym - Dzieci, których rodzice lub opiekunowie chcą, by zostały zaszczepione przeciw COVID-19
 Ciąża	Wszyscy	Wszystkie kobiety w ciąży między 32. a 36. tygodniem	Wszystkie kobiety, w tym po porodzie i w okresie karmienia piersią
 Dorośli	Wszyscy w wieku 18 lat i starsi	- Dorośli w wieku 50–74 lat są narażeni na zwiększone ryzyko ciężkiej choroby wywołanej przez RSV - Wszyscy dorośli w wieku 75 lat i starsi	Wszyscy w wieku 18 lat i starsi

**Inne szczególne sytuacje obejmują: mieszkańców ośrodków opieki długoterminowej lub innych miejsc zbiorowego pobytu; osoby, które nigdy nie były zaszczepione przeciw COVID-19; oraz osoby, których domownicy są narażeni na wysokie ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19.*