

Your baby's hearing screening shows that more testing is needed. Many babies who don't pass the screening are found to have normal hearing. Yet, some babies are born with a permanent hearing loss. It is important that a special diagnostic hearing test be done by an audiologist who is trained to work with babies.



How to follow-up after not passing newborn hearing screening:

1. Call your baby's doctor for a referral and help getting a follow-up hearing test with an audiologist who works with babies and has the special equipment.
 - Talk to your baby's doctor about the option of testing for Cytomegalovirus (CMV) **prior to 21 days of age**.
2. And/or call your insurance company and tell them that your baby needs a "diagnostic hearing test". Ask what you need to do to get the test paid for by insurance.
3. If you need help locating an audiologist near you: Call University of Illinois at Chicago - Specialized Care for Children at: (800) 322-3722 or log onto www.ehdi-pals.org for a national listing of pediatric audiologists.
4. Call the pediatric audiologist and make an appointment.
5. At the appointment with the pediatric audiologist:
 - Confirm the audiologist takes your insurance, medical card and/or Specialized Care for Children.
 - Have the audiologist send the test results to your baby's doctor and to the Illinois Department of Public Health.

Pregnant women who contract CMV can pass the virus to their unborn baby, which can result in multiple disabilities including: hearing loss, vision loss, poor brain growth, cerebral palsy, epilepsy, and in rare cases, fetal death. If your infant did not pass the newborn hearing screening in the hospital, discuss the options for testing for CMV prior to 21 days of life.

(Open for target lang)

Babies are tested for hearing loss at birth. Knowing how much a baby can hear as early in life as possible means your child will not miss out on communication and important learning experiences.



The sooner you start, the further they get.

Professionals who may work with your baby:

Pediatric Audiologist:

health care provider who has special training and equipment for testing babies.

Otolaryngologist or Otologist:

medical doctor who specializes in the problems of the ear, nose and throat and is sometimes called an ENT doctor.



Next Steps for Newborn Hearing Screening Follow-up

Next Steps for Newborn Hearing Screening Follow-up



Program Goals:

- Screen hearing no later than 1 month
- Identify a hearing loss no later than 3 months
- Connect to intervention and services no later than 6 months

If your baby did not pass the newborn hearing screening, a follow-up hearing test is the only way to find out if there is a hearing loss.

If your baby did not pass the newborn hearing screening, a follow-up hearing test is the only way to find out if there is a hearing loss.

For Information (Đề Cung Cấp Thông Tin)

Referrals and Resources (Giới Thiệu và Các Nguồn Lực)



dsc.c.uic.edu

1-800-322-3722 (Voice/Thoại)

Hospital Screening (Tầm Soát Tại Bệnh Viện)

Illinois Department of Public Health
(Sở Y Tế Công Cộng Illinois)

1-217-782-4733 (Voice/Thoại)
1-800-547-0466 (TTY)

Early Intervention (Can Thiệp Sớm)

Sở Dịch Vụ Nhân Sinh Illinois
- Can Thiệp Sớm

You may call the automated helpline at:
(Quý vị có thể gọi đến đường dây trợ giúp tự động theo số:)

1-800-323-4769 (Voice/Thoại)
1-800-447-6404 (TTY)

www.dhs.state.il.us/EI

This publication was supported in part by the Department of Health & Human Services under Award No. 1 H61MC04498-09-02 and its contents are solely the responsibility of the authors and do not necessarily reflect the views of the Department of Health & Human Services.

Ấn phẩm này được hỗ trợ một phần của Cơ Quan Y Tế & Dịch Vụ Nhân Sinh theo Quyết định số 1 H61MC04498-09-02 và nội dung hoàn toàn thuộc trách nhiệm của các tác giả và không phản ánh quan điểm của Cơ Quan Y Tế & Dịch Vụ Nhân Sinh.

Trẻ sơ sinh được kiểm tra thính giác ngay khi mới sinh. Sớm biết tình trạng thính giác của con quý vị thì con quý vị sẽ không bị lỡ những trải nghiệm giao tiếp và học tập quan trọng.



Bắt Đầu Càng Sớm, Trẻ Càng Được Hỗ Trợ Nhiều.

Những chuyên gia có thể làm việc với con quý vị:

Bác Sĩ Thính Giác Nhi Khoa:
nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe được đào tạo và có thiết bị đặc biệt để kiểm tra trẻ sơ sinh.

Bác Sĩ Tai Mũi Họng hoặc Bác Sĩ Chuyên Khoa Tai:

bác sĩ chuyên về các vấn đề tai, mũi và họng và đôi khi được gọi là bác sĩ ENT.

Tầm soát thính giác của con quý vị cho thấy cần làm thêm các kiểm tra. Nhiều trẻ không đạt kết quả tầm soát nhưng lại có thính giác bình thường. Nhưng, một số trẻ bị mất thính giác bẩm sinh. Cần có bác sĩ thính giác được đào tạo khám bệnh cho trẻ em tiến hành kiểm tra đặc biệt chẩn đoán thính giác.



Cách theo dõi sau khi trẻ không đạt kết quả tầm soát thính giác:

- Hãy gọi cho bác sĩ của con quý vị để được giới thiệu và giúp kiểm tra theo dõi thính giác với một bác sĩ thính giác chuyên khám cho trẻ em và có thiết bị đặc biệt.
 - Trao đổi với bác sĩ của con quý vị về lựa chọn kiểm tra Vi-rút Cytomegalo (CMV) trước 21 ngày tuổi.
- Và/hoặc gọi cho công ty bảo hiểm của quý vị và thông báo rằng con quý vị cần làm “kiểm tra thính giác chẩn đoán”. Hỏi xem quý vị cần làm gì để được bảo hiểm chi trả cho kiểm tra này.
- Nếu quý vị cần giúp đỡ tìm một bác sĩ thính giác gần nhà quý vị: Hãy gọi cho Ban Chăm Sóc Trẻ Em Đặc Biệt - của Đại Học Illinois tại Chicago theo số: (800) 322-3722 hoặc đăng nhập vào www.ehdi-pals.org để xem danh sách các bác sĩ thính giác nhi khoa trên toàn quốc.
- Gọi điện cho bác sĩ thính giác nhi khoa và hẹn thăm khám.
- Tại cuộc hẹn thăm khám với bác sĩ thính giác nhi khoa:
 - Xác nhận bác sĩ thính giác nhận thẻ bảo hiểm, y tế và/hoặc Chăm Sóc Đặc Biệt Cho Trẻ Em.
 - Yêu cầu bác sĩ thính giác gửi kết quả kiểm tra cho bác sĩ của con quý vị và cho Sở Y Tế Công Cộng Illinois.

Phụ nữ mang thai nhiễm CMV có thể truyền vi-rút này sang thai nhi, có thể gây ra nhiều khuyết tật gồm: mất thính giác, mất thị giác, kém phát triển não, bại não, động kinh, và trong những trường hợp hiếm hoi, tử vong thai nhi. Nếu con quý vị không đạt kết quả tầm soát thính giác lúc mới sinh trong bệnh viện, hãy thảo luận về việc xét nghiệm CMV trước 21 ngày tuổi.

(Open for English)